

GENTAPOLYCORT® oogdruppels (diapositief)

DIERGEHEESMIDDEL UDA

Samenstelling

Bevat per ml waterige oplossing: 3 mg gentamicine (als gentamicinesulfaat), 10.000 I.E. polymyxine B sulfaat en 1 mg dexamethason (als dexamethasonnatrium-fosfaat).

Beschrijving

GENTAPOLYCORT oogdruppels zijn kleurloos en helder en bevatten als werkzame bestanddelen gentamicinesulfaat, polymyxine B sulfaat en dexamethason. Gentamicine is een antibioticum uit de groep van de aminoglycosiden en heeft een bactericide werking tegen zowel gramnegatieve als enkele grampositieve bacteriën.

Het antibacteriële spectrum van gentamicine omvat staphylococci, E. coli, Enterobacter, Salmonella, Serratia, Klebsiella, Proteus, Pasteurella, Pseudomonas aeruginosa en Corynebacterium.

De ontwikkeling van bacteriële resistentie is meestal te wijten aan overdracht van R-factoren middels plasmiden en komt als regel voort uit het feit dat de bacterie inactiverende enzymen produceert.

De resistentie gaat vaak gepaard met een multiple resistentie tegen andere, niet-aminoglycoside, antibiotica.

Polymyxine B sulfaat heeft een bactericide werking tegen uitsluitend specifieke gram-negatieve bacteriën, speciaal tegen Pseudomonas aeruginosa en Escherichia coli. Resistentie is (nog) niet waargenomen tegen origineel gevoelige kiemen.

Het antimicrobiële spectrum van beide antibiotica bestrijkt bijna alle bacteriën welke bij oog-infecties pathogeen zijn.

Beide antibiotica zijn alleen lokaal werkzaam en daarom uitsluitend werkzaam bij externe oog-infecties.

Dexamethason, een synthetisch glucocorticoid, werkt in lage dosering antiflogistisch en verhindert buitensporige weefselreacties die kunnen optreden bij infecties, allergieën en traumata.

Indicaties

Infecties van het voorste oogsegment, zoals keratoconjunctivitis, allergische conjunctivitis, sklerokeratitis en blepharitis veroorzaakt door voor gentamicine en polymyxine B gevoelige bacteriën zoals Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Staphylococcus aureus op geleide van een specifiek antibiogram bij hond en kat.

Contra-indicaties

- ulcus cornea
- oogaandoeningen die gepaard gaan met diepe ulceraties zonder vascularisatie
- oogaandoeningen van virale oorsprong
- glaucoom.

In acht te nemen veiligheidsmaatregelen

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Bijwerkingen

- topicaal toegepaste corticosteroiden kunnen de intraoculaire druk verhogen
- topicaal toegepaste corticosteroiden remmen de epithelisatie van de cornea.

Waarschuwingen

Bij diepe ooginfecties waarbij dreiging bestaat voor een systemische infectie tevens systemische antibiotica toedienen.

Wachtijd

Geen.

Toedieningswijze en dosering

Uitsluitend voor lokale toepassing in het oog bij honden en katten.

De aanbevolen dosering bedraagt 1-2 druppels, 3-4 maal daags in de conjunctivaalzak brengen, gedurende minimaal 3-5 achtereenvolgende dagen.

Bewaring

Koel (8-15°C) en buiten het bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid aangebroken flacon: 30 dagen, mits koel (8-15°C) bewaard.

Voor gebruik altijd controleren of de oplossing helder is en geen verontreinigingen bevat. Verontreinigde oplossing nooit gebruiken.

Verpakking

Druppelflacon met 5 ml.

REG NL 02755

Registratiehouder

AST Beheer B.V., Oudewater

Status:

12.1993